

AVIFLU

COMPOSITION

Vaccin inactivé sous forme huileuse contre l'Influenza aviaire.

ESPECES CIBLES

Volailles

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Pour une utilisation sous-cutanée ou intramusculaire.

Poulets de chair : 0,2 ml par poussin d'un jour par voie sous-cutanée.

Repro et pondeuses : 0,2 ml par oiseau jusqu'à 3 semaines d'âge.

Revaccination à 16-18 semaines d'âge avec une dose de 0,5 ml en sous-cutanée/intramusculaire.

En cas d'épidémie grave, une vaccination supplémentaire devrait s'appliquer à environ 10 semaines d'âge (avec 1 dose de 0,5 ml).

PRECAUTION D'EMPLOI

Ce produit contient de l'huile minérale, l'injection accidentelle peut entraîner de graves douleur et gonflement, particulièrement si injecté dans une articulation ou un doigt et dans de rares cas pourrait entraîner la perte du doigt touchée si une attention médicale prompte n'est pas donnée.

Si vous vous êtes accidentellement injecté ce produit, consulter un médecin rapidement même si seulement une très petite quantité est injecté et prendre la notice avec vous. Consulter un médecin si la douleur persiste pendant plus de 12 heures après le premier examen médical

CONTRE INDICATION

Ne pas administrer par voie intramusculaire chez les poulets de moins de 3 semaines d'âge.

EFFETS SECONDAIRES

Un gonflement diffus transitoire peut survenir au niveau du site d'injection persistant pendant quelques jours.

DELAI DE VALIDITE

24 mois dans son emballage d'origine à température entre +2 et +8°C.

Après l'ouverture des flacons, le produit doit être utilisé dans les 10 heures

TEMPS D'ATTENTE

Nul