

COLVASONE

Solution injectable

Anti-inflammatoire



Composition

Dexaméthasone	2 mg
Excipient	q.s.p. 1 ml

Indications

Colvasone est indiqué chez les bovins, équins, ovins, chiens et chats lors de :

Etats de choc.

Etat allergique.

Syndromes infectieux avec réactions inflammatoires : mammites aiguës, arthrite, fourbure (à l'exclusion du cheval), dermatite,...

Acétonémie (vache)

Toxémie de gestation

Induction de la parturition chez les ruminants.

Administration et Posologie

Voie intramusculaire (IM) ou Intraveineuse (IV).

Bovin, Equin, Ovin : 1 ml par 25 Kg de PV.

Chien, Chat : 1 ml par 10 Kg de PV.

A renouveler l'injection 24 à 48 h si nécessaire.

Contre indications et Précautions

Animaux souffrant d'insuffisance rénale, de diabète, d'ostéoporose.

Parasitisme intense

Vache ou brebis au dernier tiers de gestation lorsqu'on ne désire pas l'induction de la parturition.

Assurer une couverture antibiotique à large spectre en cas de maladie infectieuse.

Ne pas prolonger inutilement le traitement afin d'éviter la suppression de l'ACTH et par la suite, l'aplasie des surrénales.

Délais Viandes et abats : 21 jours
Lait : 48 heures.

d'attente

Conditions Conserver à l'abri de la lumière et à T < 25°C.

de stockage

Présentations Flacon de 50 ml.