

# DOXYNOVA

Poudre soluble  
Antibiotique à large spectre



---

## Composition

Doxycycline (s / f hyclate) 5,00 g  
Excipient q.s.p 100 g

---

## Indications

Traitement et prévention des germes sensibles à la Doxycycline chez les Volailles et les Veaux.

**Volailles** Prévention et traitement des affections respiratoires.

**Veaux** Traitement et prévention des affections respiratoires et digestives

---

## Posologie

Voie orale, à diluer dans l'eau de boisson ou l'aliment liquide.

**Veaux** : 10 mg de doxycycline / kg PV et par jour, soit 1 g de DOXYNOVA pour 5 kg de poids vif par jour

**Volailles** : 0 à 15 jour d'âge : 1 g de DOXYNOVA par litre d'eau de boisson et par jour (soit 50 ppm)

> 15 jours d'âge : 2 g de DOXYNOVA par litre d'eau de boisson et par jour (100 ppm).

*Durée du traitement :*

Prévention : 1 à 3 jours consécutifs

Traitement : 3 à 5 jours consécutifs

---

## Contre indications

- Ne pas administrer chez les bovins à rumen fonctionnel dont la voie orale est peu efficace
- Ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine

---

## Délais d'attente

Veaux : Viandes et abats : 14 jours

Viandes de volailles: 04 jours

Palmipèdes, dindes, dindons : 06 jours

---

## Conditions de Stockage

A l'abri de la chaleur

Présentation **Pot 1Kg**



Laboratoires  
NOVAVET