

HEXAZOLE L.A.

Solution injectable
Association antibiotique et anti-inflammatoire



Composition

Oxytétracycline (sf duhydrate)	300 mg
Flunixin (sf meglumine)	20 mg
Excipient q.s.p.	1 ml

Indications

HEXAZOLE LA est indiqué dans les affections causées par une large gamme d'organismes incluant *Pasteurella ssp*, *Corynebacterium pyogenes*, *Staphylococcus aureus* et certains mycoplasmes sensibles à l'oxytétracycline. L'action anti-inflammatoire dure 24 à 36 heures et l'action antibactérienne est de 5 à 6 jours après une administration unique.

Administration et Posologie

Solution injectable en intramusculaire profonde (IM) chez les Bovins : 30 mg d'oxytétracycline et 2 mg de Flunixine par Kg de PV, soit 1 ml de HEXAZOLE LA par 10 Kg de PV.

Contre indications et Précautions

Animaux moins de 6 semaines d'âge.
Animaux hypersensibles à l'oxytétracycline.
Sujets atteints de problèmes hépatiques.
Animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine.
Les sites d'injection d'autres traitements doivent être distincts.
Eviter la voie intraveineuse.

Délais d'attente Viandes et abats : 35 jours

Conditions de stockage Conserver à l'abri de la lumière et à T < 25°C.

Présentations Flacon de 50 ml et 100 ml.