


NOVAMISOL

Solution buvable

Anthelminthique pour bovins, ovins, caprins et volaille



Composition	100 ml de NOVAMISOL contient :
	Chlorhydrate de lévamisole 5.0 g
	Excipient. qsp 100.0ml

Indications Parasitoses internes chez bovins, ovins, caprins et volailles :

- Gastro-entérites parasitaires (strongylose gastro-intestinale).
 - Bronchite vermineuse (strongylose respiratoire).
 - Hétérakidose, ascaridiose et capillariose des volailles.
-

Posologie *Administrer par voie orale*

- **Bovins, ovins et caprins** : (seringue ou pistolet doseur)
8 ml par 50 Kg de poids vif sans dépasser 10 ml chez les ovins et caprins, 100 ml chez les bovins.
 - **Volaille** : (mélanger à l'eau de boisson)
1 ml pour 2,5 kg de poids vif, soit environ 4 ml par litre d'eau de boisson.
-

Contre Ne pas administrer aux équins et aux insuffisants rénaux ou **indications** hépatiques.

Délais d'attente	Lait :	24 heures (2 traites)
	œufs:	5 jours
	Viandes:	3 jours

Conditions de stockage Dans l'emballage d'origine à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Présentations Flacons de 250 ml ; 500 ml ; 1 litre et 2.5 litres