

NOVAMOX

Poudre soluble

Antibiotique à large spectre



Composition	100g de Novamox contient:
	Amoxicilline 10g
	Excipient q.s.p. 100g

Indications Infections sensibles à l'amoxicilline

- **Volailles** : Colibacillose, Salmonellose, Coryza aviaire, Surinfections des maladies virales.
- **Veaux, agneaux** : Infections respiratoires, Infections digestives, Panaris.
- **Cheval** : Infections respiratoires, Infections à E.coli, streptococcus, Proteus et Klebsiella.

Posologie *Diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à la ration alimentaire*

La dose est de 10 mg/Kg/jour d'amoxicilline (100 mg/ Kg / j de Novamox).

- **Volailles** : En milieu infecté la dose est de 20mg/kg/jour d'amoxicilline, soit un pot de 500 g de Novamox pour 2500 kg.
Il est conseillé d'administrer la dose en « pulse-dosing ».
- **Autres espèces** : 10mg/kg/j d'amoxicilline (100 mg/Kg/j de Novamox).
En cas d'infections graves, doubler la dose.

La durée du traitement est de 3 à 5 jours.

Contre indications Allergie connue à l'amoxicilline et/ou aux pénicillines
Ne pas donner aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine

Délais d'attente Viande et abats : 2 jours

Conditions de stockage Dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Présentations Pots de : 100g, 200g, 500g et 1 kg