

RUMINEX

Poudre orale
Régulateur des fonctions biochimiques du rumen



Composition

Propionate de calcium	50,00 g
Méthionine	4,00 g
Gentiane	8,00 g
Gluconate de Cobalt	36,00 mg
Vitamine B6	36,00 mg
Excipients q.s.p	100,00 g

Indications

Prévention et traitement des troubles gastriques et métaboliques des ruminants

- Atonie et surcharge du rumen
- Accidents consécutifs aux changements brutaux des régimes.
- Intoxications alimentaires (excès d'urée)
- Traitement complémentaire des réticulites traumatiques.

Etats hypoglycémiant :

- Subcétose et cétose
- Toxémie de gestation

Posologie

Administer le produit en suspension dans ½ à 1 litre d'eau au pistolet doseur ou lentement à la bouteille

Traitement curatif :

Bovin adulte: 2 sachets à 12 heures d'intervalle

Jeune bovin : ½ sachet 1 à 2 fois par jour

Mouton – chèvre : ¼ de sachet par jour

Traitement préventif

Bovin adulte: ½ sachet par jour

Jeune bovin : ¼ sachet par jour

Durée du traitement : 2 à 3 jours consécutifs

Contre indications Néant

Délais d'attente Néant

Conditions de Stockage Dans l'emballage commercial à température ambiante et à l'abri de l'humidité

Présentation **Boîte de 2 sachets de 100g**