

ANTI-INFECTIEUX

NOVOTRYL INJECTION



Solution injectable

Composition

Enrofloxacin 10,00 g

Excipient 100 ml

Espèces cibles

Bovins, ovins, caprins, équins, porcins, chiens et chats

Indications

Chez les bovins, ovins caprins et équins: Traitement des infections respiratoires Bronchopneumonies, pneumonies, Traitement des infections articulaires à *Mycoplasma bovis*, Traitement des mammites aiguës, métrites, entérites et rétention placentaire.

Chez les porcins:- Traitement des infections respiratoires à *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae* et *Actinobacillus pleuropneumoniae*. Traitement des infections urinaires, dues à *Escherichia coli*. Chez les chiens et chats:- Traitement des infections respiratoires, uro-génitales (cystite urinaire), cutanées (plaies et abcès), Traitement et prévention de l' Ehrlichiose canine

Posologie

Bovins, Ovins, Caprins, chiens et chat : 5 mg d'enrofloxacin par kg de PV et par jour, soit 0,5 ml de la solution NOVOTRYL injectable /10 kg de PV/ jour pendant 4 à 5 jours consécutifs. Porcins et équins : 2,5 à 5 mg d'enrofloxacin par kg de PV/j en IM profonde pendant 3 à 4 jours consécutifs, soit 0,25 à 0,5 ml de la solution NOVOTRYL injectable pour 10 kg de PV/ j pendant 3 à 4 jours.

Contre indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux fluoroquinolones ; Ne pas traiter les truies gestantes à fortes doses.

Délais d'attente

Viande et abats : 12 jours, Lait : 4 jours (08 traites).

Conditions de Stockage

25 °C+2 ° ; 65% HR+ 5 %. 28 jours après 1ère ponction.

Présentation

Flacon de 100 ml



N24