

VANGUARD RABIES 3 YEARS

VACCIN ANTIRABIQUE



Composition

Virus rabique souche PV Paris/BHK/purif.Pass3,SVR-289>10^{7,35} TCID₅₀/ml

Espèces cibles :

Chien, Chat, Bovin et Ovin

Indications

Immunisation des espèces cibles âgées de plus de 3 mois contre la rage.

Posologie

Chiens et Chats :

Bien agiter le flacon, et de façon aseptique, administrer 1 ml par voie sous cutanée.

Les chiens peuvent être vaccinés par voie IM ou SC. La primovaccination est faite aux animaux en bonne santé âgés de 3 mois ou plus. Le rappel est fait 1 an après.

Bovins et Ovins :

Bien agiter. Administrer de façon aseptique 2 ml par voie intramusculaire.

La primovaccination est faite à partir de 3 mois d'âge. Un rappel doit être fait 1 an après.

Contre-indication

Ne pas vacciner les femelles gestantes.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la gentamycine.

Délai d'attente

Bovin et ovin : Viande et abats : 21 jours

Conditions de stockage

Conserver à une température de 2 à 8°C. Eviter le gel. Le vaccin doit être utilisé immédiatement après ouverture. Utiliser des seringues et des aiguilles stériles.

Présentation

Flacon unidosé de 1 ml.